1a JORNADA DE VALIDACIÓ SANITÀRIA

28 DE NOVEMBRE

Auditori Josep Irla

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CatSalut
Servei Català de la Salut
Regió Sanitària Girona

Institut Català de la Salut
Direcció d'Atenció Primària Girona

Cilostazol

“A propòsit d’un cas ”

Montse Aldrich

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CatSalut
Servei Català de la Salut
Regió Sanitària Girona

Institut Català de la Salut
Direcció d'Atenció Primària
Girona

67 anys

ACTIUS | INACTIUS | I.Q. | A.F (?) | NOCs

Cancelar | Tots | Prioritzats

- ACO (ANTICOAGULANT ORAL)
- FIBRIL·LACIÓ AURICULAR PAROXÍSTIC
- HTA ESSENCIAL
- ARTERIOSCLEROSIS
- CLAUDICACIÓ INTERMITENT
- HIPERCOLESTEROLÈMIA

Marcar | SPD | Prefaseg

Medicament	Principi Actiu	Via	Posologia	Durada	Envàs x dies		Vigència	Signat	Env.
ACIDO ACETILSALICILICO TEVA 100MG 30 COMPRIMIDOS GASTRORRESISTEN	ACID ACETILSALICILIC	Oral	1 x 24 h.	Indefinida	1	30	365		
ATORVASTATINA ALTER 40MG 28 COMPRIM RECUB PELI EFG	ATORVASTATINA CALCI TRIH	Oral	1 x 24 h.	Indefinida	1	28	365		
LISINOPRIL BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG	LISINOPRIL, DIHIDRAT	Oral	1 x 24 h.	Indefinida	1	28	365		
OMEPRAZOL APOTEX 20MG 56 CAP DURAS GASTRORRESIST(BLISTER) EFG	OMEPRAZOL	Oral	1 x 24 h.	Indefinida	1	56	365		
PARACETAMOL RATIO 650MG 40 COMPRIMIDOS EFG	PARACETAMOL	Oral	1 x 12 h.	Indefinida	1	20	365		
SINTROM 4MG 20 COMPRIMIDOS	ACENOCUMAROL	Oral	Segons pauta	Indefinida	1	30	365		
CILOSTAZOL ARISTO 50MG 56 (4 X 14) COMPRIMIDOS EFG	CILOSTAZOL	Oral	1 x 12 h.	28 dies	1	28	28		

ARTERIOPATIA PERIFÉRICA; ATEROSCLEROSI

- Va anar de visita amb el DR CIRURGIA VASCULAR, qui li va receptar CILOSTAZOL 50mg 1-0-1 MANTENINT ADIRO i derivat per part d'ell al H.JTRUETA per valorar IQ

FEM REVISIO juntament amb referent Farmacologa centre, existint per revisio contraindicacio de cilostazol en cas de prendre de forma concomitant 2 o mes antiagregants plaquetaris

Què hem de tenir en compte abans de validar un cilostazol?

Indicacions

- Claudicació intermitent (Estadi II de Fontaine)
- Informe Hospital

Posologia

- 100 mg / 12 hores, 30 minuts abans d'àpats

- 50 mg / 12 hores si pren:
  - Omeprazol
  - Antifúngics azòlics, Macròlids, Inhibidors de Proteasa.

Efectivitat

Institut Català de la Salut

CANM
Comité d'Avaluació de Nous Medicaments

Núm. 5
Abril 2010

Dictamen

Cilostazol

Nom comercial Ekistol® Pletal®	**Laboratori** Lacer, SA Otsuka Pharmaceutical, SA
Composició Cilostazol	**Fàrmacs comparadors** Pentoxifil·lina, buflomedil, naftidrofuril
Procediment i data d'autorització Reconeixement mutu, Abril de 2009	**Data d'avaluació** Abril de 2010
Qualificació del CANM *: **No suposa un avenç terapèutic**	Explicació de qualificació: El benefici dels fàrmacs usats en el tractament simptomàtic de la claudicació intermitent és limitat. Cilostazol no millora la relació benefici-risc d'altres fàrmacs disponibles.

* Possibles qualificacions: important millora terapèutica; modesta millora terapèutica; aporta en situacions concretes; no suposa un avenç terapèutic; no valorable: informació insuficient

Després de dur a terme l'avaluació comparativa de **CILOSTAZOL EN LA CLAUDICACIÓ INTERMITENT** respecte als fàrmacs comparadors, segons l'anàlisi de l'evidència científica publicada fins a aquest moment, el Comitè recomana:

Continuar utilitzant el tractament habitual, ja que l'evidència comparativa disponible de cilostazol no ha demostrat major eficàcia ni seguretat.

Efectivitat

Lloc en la terapèutica: El tractament de la claudicació intermitent (CI) combina les mesures preventives per tal d'evitar esdeveniments cardiovasculars (modificació dels factors de risc, programes d'exercici físic i tractament antiagregant); juntament amb el tractament dels seus símptomes. Hi ha una evidència clara que els programes d'exercici físic supervisat són el millor tractament en els pacients amb CI, ja que redueixen el risc cardiovascular i milloren els símptomes de la CI.

El benefici dels fàrmacs usats en el tractament simptomàtic de la CI és limitat; els estudis presenten defectes metodològics, biaixos de publicació i resultats controvertits i poc consistents. Cilostazol ha demostrat millorar la distància màxima caminada i la distància sense dolor respecte de placebo en pacients amb CI. No es coneix el seu efecte sobre la morbimortalitat cardiovascular. El perfil de seguretat de cilostazol no sembla millor que el d'altres fàrmacs.

En resum, cilostazol s'afegeix com una alternativa més a l'arsenal terapèutic per al tractament simptomàtic de la CI, sense que millori la relació benefici-risc d'altres fàrmacs disponibles.

Contraindicacions

- Hipersensibilitat
- Insuficiència Renal Greu
- Insuficiència Hepàtica Moderada/Greu
- Insuficiència Cardíaca Congestiva
- Embaràs
- Risc d'hemorràgies
- Taquiarítmies Ventriculars Greus o QT prolongat
- **Tractament amb 2 o més antiagregrants** o anticoagulants
- Angor inestable, IAM o I.Q. Coronaria els darrers 6 mesos

Validem Cilostazol ?

- ✓ Indicacions
- ✓ Posologia
- ✗ No Contraindicacions

MOLTES GRÀCIES

Generalitat de Catalunya
Departament de Salut

CatSalut

Servei Català
de la Salut

Institut Català de la Salut
Direcció d'Atenció Primària
Girona